AVIFAUNA

LUIZ DOS ANJOS (COORDENADOR), M ÁRCIO RODRIGO GIMENES (PÓS-GRADUANDO), ALAN LOURES RIBEIRO (PÓS-GRADUANDO) E LUCIANA BAZA MENDONÇA (PÓS-GRADUANDO).

RESUMO

Os estudos ornitológicos, embora não previstos na proposta original do projeto, foram iniciados no período, em face da importância deste grupo taxonômico nos processos biológicos vigentes na planície. O objetivo inicial foi caracterizar a distribuição da comunidade de aves entre as ilhas da região, tomando-se em conta a área, diversidade de habitats e estado de conservação destas. Em seguida, passaram a ser desenvolvidos projetos específicos sobre grupos de aves mais relevantes em relação a função ecológica desenvolvida na planície (Falconiformes, Ciconiiformes e Trochilidae). Considerando-se apenas as ilhas estudadas houve o registro de 113 espécies de aves, podendo ser incluídas outras 9 espécies de Falconiformes constatadas em diversos pontos da planície. Os resultados obtidos até o momento no estudo da avifauna demonstram a importância da cobertura florestal na determinação da riqueza de espécies, já que, de uma maneira geral, as regiões da planície de inundação onde as florestas foram menos impactadas têm-se mostrado capazes de suportar maior diversidade de aves.

INTRODUÇÃO

A região noroeste do Estado do Paraná e porções adjacentes do Mato Grosso do Sul e São Paulo é uma das áreas cuja avifauna encontra-se melhor conhecida em todo o sul do Brasil (Straube et al., 1996). Entretanto, há escassez de trabalhos realizados na planície de inundação do rio Paraná, podendo-se mencionar o de Straube & Bornschein (1995). Ainda assim, este trabalho limitou-se ao levantamento de espécies em alguns pontos da planície, mas sem maiores análises dos aspectos ecológicos da comunidade de aves e da interação dessa com o ambiente.

O rápido processo de antropização na região resultou, em curto espaço de tempo, numa descaracterização da cobertura florestal original

da região, restando apenas alguns fragmentos florestais próximo ao leito do rio Paraná e no conjunto de ilhas que formam o arquipélago do referido rio (Campos & Souza, 1997). O processo de desmatamento e sucessão natural, aliado ao alagamento sazonal de parte da planície, geram uma variedade de diferentes habitats que se modificam conforme o regime de cheias do rio (Souza et al., 1997). As aves são consideradas como ideais indicadores ecológicos para o ambiente terrestre, principalmente pelo fato de serem bastante sensíveis a modificações em seu habitat (Stotz et al., 1996). Dessa forma, torna-se importante o acompanhamento da comunidade de aves na planície de inundação, verificando sua resposta às modificações ambientais, tanto em termos de

número e composição de espécies, como também em relação a sua distribuição na área.

Os estudos ornitológicos inseridos no PELD tiveram como objetivo inicial comparar a comunidade de aves de duas ilhas maiores e que sofreram intenso processo de antropização com uma ilha bem menor, mas com pouca perturbação antrópica, avaliando quais seriam mais importantes em termos de preservação. Posteriormente, passaram a ser desenvolvidos estudos mais específicos sobre alguns grupos de aves que desempenham papel fundamental nos processos ecológicos vigentes na planície de inundação (Falconiformes, Ciconiiformes e Trochilidae).

MATERIALE MÉTODOS

1. Estudo da comunidade de aves das ilhas

Neste estudo foram abrangidas as ilhas Mutum, Porto Rico e Bandeira (22°44' a 22°48' S e 53°21' a 53°22' W), situadas entre os municípios de Porto Rico (PR) e Taquaruçú (MS). Cinco ambientes foram reconhecidos nessas ilhas: florestas, zonas arbustivas, campos abertos, zonas aquáticas e bancos de areia. Esses ambientes estão presentes nas três ilhas, embora em proporções diferentes, com exceção dos bancos de areia, que só ocorrem na ilha Bandeira (Fig. 1).

Foram realizadas amostragens mensais nas três ilhas, com início em dezembro de 1999 e término em setembro de 2000. Determinou-se um transecto padrão que incluiu todos os ambientes pré-estabelecidos dentro de cada ilha, sendo este percorrido sempre no mesmo sentido (Fig. 1). As amostragens começaram sempre uma hora após o sol nascente e o tempo de permanência na ilha foi de cerca de 8 horas. Durante o percurso, o observador (sempre o mesmo) identificou cada ave observada, com o auxílio de um binóculo, anotando em que ilha e em que ambiente ela estava presente. As vocalizações foram registradas em um gravador

portátil. Cada espécie foi registrada somente uma vez em cada ambiente em um mesmo dia de amostragem.

A partir dos dados coletados foram calculadas as frequências de ocorrência das espécies de aves em cada ilha (número de amostragens em que a espécie esteve presente na ilha dividido por 10 e multiplicado por 100) e o seu grau de relação aos ambientes (número de amostragens em que a espécie esteve presente em determinado ambiente, dividido pelo total de amostragens em que ela esteve presente na ilha e multiplicado por 100). Foi construído um gráfico analisando o número acumulado de espécies ao longo dos meses de amostragens. Chi-quadrado e tabela de contingência ($\alpha = 0,05$) foram utilizados para determinar se havia diferença significativa entre a proporção do número de espécies em classes de frequência de ocorrência geral e em ambientes. A similaridade em relação à composição das espécies nas ilhas e nos ambientes foi avaliada através do índice de Sørensen.

2. Falconiformes

O estudo dos Falconiformes (urubus, águias, gaviões e falcões) está sendo desenvolvido visando determinar a distribuição das espécies existentes na região, em função dos diferentes ambientes encontrados, bem como avaliar o atual estado de conservação destas aves, buscando-se o estabelecimento de estratégias preliminares de conservação do ecossistema. As amostragens foram realizadas durante os meses de agosto a outubro de 2001 na planície de inundação do Alto rio Paraná (Tab. 1).

Para obtenção dos dados de campo, foi utilizada a técnica de contagem por pontos (Fuller & Mosher, 1987). Basicamente, este método objetivou registrar o número mínimo de indivíduos de cada espécie em quadrados de 1 km², durante 4 horas, utilizando procedimento padronizado, em um único dia, obtendo com isto a presença ou ausência de cada espécie em um determinado local. Foram realizados ainda

transectos, utilizando barco e veículo, respectivamente nas áreas alagadas e/ou contornadas por rios e estradas, a fim da consideração do registro de possíveis espécies que não foram detectadas nas amostras dos quadrados. Todas as espécies foram identificadas através de métodos de observação utilizando binóculos 8x35 e 7x50, e através de vocalizações. Somente foram considerados dentro dos quadrados aqueles indivíduos que apresentavam-se pousados, forrageando ou realizando “displays” claramente dentro destas unidades amostrais. Imaturos, aves meramente cruzando o local ou voando muito acima do que

normalmente forrageiam foram excluídas das amostras. Quando os registros foram obtidos a partir de vocalizações, foram considerados no máximo dois indivíduos em cada quadrado a fim de evitar uma possível superestimação. Em função das diferentes formas de ocupação de hábitat realizado pelas espécies, todos os ambientes foram percorridos, incluindo o interior das matas (Sick, 1993; Thiollay, 1996). Os principais tipos de hábitat encontrados dentro da região de estudo foram agrupados em 5 categorias: campos e pastagens; várzea; mata ciliar; borda de mata e capoeira; matas..

Figura 1. Distribuição dos ambientes nas ilhas estudadas (de cima para baixo, ilhas Mutum, Porto Rico e Bandeira). As linhas tracejadas indicam o transecto e as setas a direção em que este foi percorrido.

Com base nas análises preliminares, foram obtidos os valores percentuais de cada espécie em cada local amostrado. O Índice de similaridade de Sørensen (C_s) foi utilizado para analisar a similaridade entre os habitats em

relação às espécies de aves de rapina diurnas encontradas (Magurran, 1988): $C_s = 2j/(a+b)$, onde “j” é o número de espécies comuns aos locais, “a” é o número de espécies no ambiente A e “b” é o número de espécies presentes no ambiente B. Para fins de uma análise mais

ampla, dados que se referem a outras áreas da região noroeste do Paraná serão incorporados às

análises posteriormente, a fim de obter um melhor perfil da composição desta região.

Tabela 1. Localidades amostradas ao longo da planície de inundação do Alto rio Paraná.

Localidades	Coordenadas Geográficas
1. Ponto 1 da margem esquerda do rio Paraná	(22°46'00''S/53°15'23''W)
2. Ribeirão São Pedro	(22°45'28''S/53°13'06''W);
3. Ponto 2 da margem esquerda do rio Paraná	(22°46'46''S/53°13'44''W)
4. Ponto 3 da margem esquerda do rio Paraná	(22°47'09''S/53°15'32''W);
5. Lagoa do Finado Raimundo	(22°47'42''S/53°32'19''W)
6. Boca do Ipoitã	(22°50'13''S/53°34'07''W)
7. Lagoa Peroba	(22°54'26''S/53°38'22''W)
8. Canal Corutuba	(22°45'15''S/53°21'30''W)
9. Canal do Baía	(22°41'21''S/53°13'25''W)
10. Lagoa Maria Luisa	(22°40'42''S/53°13'25''W)
11. Margem esquerda do rio Baía	(22°42'14''S/53°15'43''W)
12. Canal Cortado	(22°48'30''S/53°22'31''W)
13. Lagoa das Garças	(22°43'37''S/53°13'32''W)
14. Ilha Porto Rico	(22°45'22''S/53°15'34''W)

3. Trochilidae

O projeto enfocando a família Trochilidae (beija-flores) tem como objetivo estudar a interação entre a falsa-erva-de-rato (*Palicourea crocea*) e os beija-flores visitantes, bem como estimar a participação dessas aves na polinização da espécie. O estudo está sendo desenvolvido na Ilha Porto Rico (localização descrita acima). As amostragens de campo começaram em novembro de 2001 e irão até outubro de 2002, abrangendo assim, um ciclo sazonal completo. Nesse período serão realizadas visitas trimestrais com duração variável, conforme o período e/ou intensidade de floração da planta. As observações serão realizadas em dois períodos diários (manhã e tarde), com duração média de 4h cada, com início e término em horários variáveis, cobrindo o período das 7:00 às 18:00. Nos dias de observação, serão tomadas medidas de temperatura, utilizando-se termômetro ambiental posicionado na sombra e de nebulosidade, estimada por meio de uma escala arbitrária.

Adicionalmente, dados meteorológicos mensais (temperatura média e pluviosidade) serão obtidos de estações meteorológicas (SIMEPAR, por exemplo).

A fenologia da floração de *P. crocea* será determinada em campo, sendo marcados cerca de 50 indivíduos da espécie para estimar a porcentagem de indivíduos com flores e/ou frutos em cada visita à área. Serão registrados a morfologia e o período de antese das flores (horário e duração), a disponibilidade de pólen e a produção de néctar. As flores serão classificadas em diferentes idades, de acordo com seu estágio de maturação (Kearns & Inouye, 1993), sendo anotadas eventuais diferenças na coloração ou em outra característica morfológica. Com o uso de paquímetro digital serão tomadas ainda medidas de comprimento da corola. Para obtenção de dados referentes à produção de néctar, as flores serão cobertas com tecido de náilon fino antes de sua abertura, garantindo que este não seja usado por nenhum nectarívoro. O néctar será retirado das flores com seringas graduadas em

m, onde será também feita a leitura de volume (Kearns & Inouye, 1993). A concentração de açúcares será medida com refractômetro de bolso (Stiles, 1975; Brown & Kodrick-Brown, 1979; Kearns & Inouye, 1993; Araujo *et al.*, 1994). A partir dos dados de volume e concentração será calculada a energia média produzida por flor (em cal ou em kJ). Em cada visita à área de estudo, alguns indivíduos serão selecionados para estimar o número de flores abertas por dia.

Os beija-flores serão observados com binóculo (10x 25). Serão registrados o período e a frequência de visitas de cada espécie de beija-flor, bem como o número de flores visitadas, duração de cada visita, altura das flores visitadas e o local de contato do corpo da ave com os órgãos reprodutivos da flor. As informações obtidas em campo serão narradas em gravador cassete portátil AIWA TP – M 130 e posteriormente transcritas para fichas padronizadas. A nomenclatura ornitológica adotada será a de Schuchmann (1999). Alguns indivíduos serão capturados com o uso de redes de neblina (5 redes) para obtenção de dados referentes à massa corpórea, comprimento total, comprimento do bico e da asa. Será também verificada a presença de pólen no corpo da ave; se presente, o pólen será retirado com fita adesiva transparente (Brown & Kodrick-Brown, 1979) e identificado.

4. *Ciconiiformes*

O estudo dos *Ciconiiformes* (garças e socós, entre outros) ainda está em fase de planejamento, com o início das amostragens de campo previsto para fevereiro de 2002. Tomando-se em conta a estreita ligação dessas aves aos ambientes aquáticos e sua reconhecida importância como predadoras da ictiofauna, a análise da distribuição das populações das diferentes espécies dessas aves nos diferentes ambientes aquáticos da planície de inundação do alto rio Paraná pode proporcionar uma idéia do estado desses ambientes, de sua produtividade

nos diferentes níveis tróficos e de particularidades de sua estrutura, além de poder fornecer indícios do nível de pressão de predação exercido por essas aves sobre a ictiofauna nos diferentes ambientes analisados.

RESULTADOS

1. Comunidade de aves das ilhas

Um total de 113 espécies de aves foram registradas nas três ilhas estudadas (Tab. 2). A ilha Mutum apresentou 99 espécies, a Bandeira 86 e a Porto Rico 82, valores estatisticamente semelhantes ($\chi^2 = 1,77$; $gl = 2$; $P > 0,05$), mesmo excluindo-se as 12 espécies que na ilha Bandeira só ocorrem nos bancos de areia ($\chi^2 = 3,42$; $gl = 2$; $P > 0,05$). Assim, embora a área amostral de cada ilha seja diferente, a riqueza específica foi semelhante. Em todas elas formou-se o platô assintótico nas curvas do número acumulado de espécies (Fig. 2).

O maior valor de similaridade foi entre as ilhas Mutum e Porto Rico (0,84), seguido por Mutum e Bandeira (0,81) e Porto Rico e Bandeira (0,76). O valor de similaridade entre as ilhas Mutum e Bandeira diminuiu para 0,75 e entre as ilhas Porto Rico e Bandeira aumentou para 0,78 quando não consideradas as 12 espécies que na ilha Bandeira só ocorrem no ambiente bancos de areia.

Em todas as ilhas o ambiente florestal apresentou o maior número de espécies (Tab. 2), sendo equitativa a distribuição nos ambientes da ilha Mutum ($\chi^2 = 6,89$; $gl = 3$; $P > 0,05$), o que não ocorreu na ilha Porto Rico ($\chi^2 = 19,66$; $gl = 3$; $P < 0,05$) e Bandeira ($\chi^2 = 47,98$; $gl = 4$; $P < 0,05$). Na comparação entre os diferentes ambientes de uma mesma ilha, os maiores valores de similaridade foram entre as florestas e as zonas arbustivas nas ilhas Mutum e Porto Rico, enquanto na Bandeira foi entre as zonas arbustivas e os campos abertos. Na ilha Bandeira, o ambiente florestal foi menos similar as zonas arbustivas e aos campos abertos do que nas outras duas ilhas (Tab. 3a,b, c).

Tabela 2. Grau de relação das espécies de aves aos ambientes (FL: florestas, AR: zonas arbustivas, CA: campos abertos, ZA: zonas aquáticas e BA: bancos de areia) e frequência de ocorrência (FO) nas três ilhas estudadas, expressos em porcentagem. A nomenclatura segue Scherer-Neto & Straube (1995).

Família / Espécie	Mutum (200 ha)					Porto Rico (103 ha)					Bandeira (14 ha)					
	FL	AR	CA	ZA	FO	FL	AR	CA	ZA	FO	FL	AR	CA	ZA	BA	FO
PHALACROCORACIDAE																
<i>Phalacrocorax brasilianus</i>				100	50				100	60					100	70
ANHINGIDAE																
<i>Anhinga anhinga</i>				100	10										100	20
ARDEIDAE																
<i>Ardea cocoi</i>				100	60				100	60						
<i>Egretta alba</i>				100	80				100	10				50	100	20
<i>Egretta thula</i>				100	70				100	30					100	100
<i>Butorides striatus</i>				100	30				100	50				100		20
<i>Nycticorax nycticorax</i>	100			50	20											
<i>Tigrisoma fasciatum</i>				100	40				100	10						
CICONIIDAE																
<i>Mycteria americana</i>				100	40											
<i>Ciconia maguari</i>				100	50											
<i>Jabiru mycteria</i>				100	20											
THRESKIORNITHIDAE																
<i>Mesembrinibis cayemensis</i>				100	10										100	10
<i>Platalea ajaja</i>				100	10										100	10
ANATIDAE																
<i>Dendrocygna viduata</i>				100	40				100	20		33,3		33,3	100	30
<i>Cairina moschata</i>			66,6	33,3	30	33,3			66,6	30			50	100		20
<i>Amazonetta brasiliensis</i>		20		100	50				100	30		50		100		20
CATHARTIDAE																
<i>Coragyps atratus</i>	66,6	16,6	16,6		60	100	25			40	100				50	40
<i>Cathartes aura</i>		20	20	80	50	100				10						
ACCIPITRIDAE																
<i>Rostrhamus sociabilis</i>				100	40				100	40						
<i>Buteo magnirostris</i>	50	66,6			60	100				10		100				10
<i>Buteogallus urubitinga</i>		100			10											
<i>Geranoospiza caerulescens</i>											100					20
FALCONIDAE																
<i>Herpetotheres cachimans</i>	100				10											
<i>Polyborus plancus</i>	66,6	66,6		33,3	30	33,3	66,6			30	66,6	66,6			33,3	30
ARAMIDAE																
<i>Aramus guarauna</i>				100	70				100	20	50	50		50	50	20
JACANIDAE																
<i>Jacana jacana</i>				100	90				100	100						
RECURVIROSTRIDAE																
<i>Himantopus himantopus</i>				100	60										100	70
CHARADRIIDAE																
<i>Vanellus chilensis</i>		10	90	80	100		10	100	50	100			11,1		100	90
<i>Charadrius collaris</i>															100	50
SCOLOPACIDAE																
<i>Tringa flavipes</i>				100	10										100	40
STERNIDAE																
<i>Phaetusa simplex</i>				100	30										100	70
<i>Sterna supercilialis</i>				100	10										100	20
RYNCHOPIDAE																
<i>Rynchops nigra</i>															100	20

Continua...

Continuação

COLUMBIDAE													
<i>Columba picazuro</i>	100	28,5	14,2	70	100	30	30	100	100	12,5		12,5	80
<i>Columba cayennensis</i>									100	25			40
<i>Zenaida auriculata</i>	37,5	50	87,5	80	62,5	50	37,5	80	71,4	28,5	14,2		70
<i>Columbina picui</i>	44,4	55,5	77,7	90					100				10
<i>Columbina talpacoti</i>	90	100	50	100	60	100	40	100	62,5	75	12,5	12,5	80
<i>Scardafella squammata</i>	66,6	33,3		30		100		10					
<i>Leptotila verreauxi</i>	100			10	100			20	100				30
PSITTACIDAE													
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	50	50	50	40	100	50	25	40	100	33,3	33,3		30
<i>Forpus xanthopterygius</i>	57,1	42,8	14,2	70	66,6	44,4	33,3	90	66,6	16,6	50		60
<i>Pionus maximiliani</i>	100	25	50	40	50	50	50	20	100	50	50		20
CUCULIDAE													
<i>Crotophaga ani</i>	20	100	10	100	33,3	77,7	44,4	11,1	90	33,3	100		30
<i>Guira guira</i>		66,6	33,3	30		100	50	60		100	100		10
<i>Tapera naevia</i>							100	20					
STRIGIDAE													
<i>Speotyto cunicularia</i>			100	10							88,8	66,6	90
CAPRIMULGIDAE													
<i>Nyctidromus albicollis</i>	100			10	100			40					
<i>Caprimulgus parvulus</i>		100		30		100		20		100			10
TROCHILIDAE													
<i>Phaethornis pretrei</i>	100			10	100			20					
<i>Hylocharis chrysura</i>	50	50		60	66,6	33,3		30	100	50			20
ALCEDINIDAE													
<i>Ceryle torquata</i>				100	20			100	40				
<i>Chloroceryle amazona</i>				100	20			100	10	20		40	40
<i>Chloroceryle americana</i>				100	20			100	10			66,6	33,3
GALBULIDAE													
<i>Galbula ruficauda</i>										100			20
PICIDAE													
<i>Picumnus cirrhatius</i>	50		75	40	100	33,3		30	50	50	50		20
<i>Picumnus albosquamatus</i>	100			30		100		10	100				40
<i>Melanerpes candidus</i>			100	10		100	100	10					
<i>Melanerpes flavifrons</i>						100		10	100				40
<i>Veniliornis passerinus</i>	100	100		10		100		20	50	50			20
<i>Colaptes melanochloros</i>	100			10	60	40		50	100	20			50
<i>Colaptes campestris</i>			100	10	25	37,5	50	80					
DENDROCOLAPTIDAE													
<i>Campylorampus</i>	100			10						100			20
<i>trochilirostris</i>													
FURNARIIDAE													
<i>Furnarius rufus</i>	40	40	90	100	50	70	70	100	90	70	60		100
<i>Synallaxis frontalis</i>	100			20					100				10
<i>Cranioleuca vulpina</i>									100				10
<i>Phacelodomus ruber</i>	77,7	55,5		90	66,6	55,5	44,4	90	85,7	57,1			70
<i>Automolus leucophthalmus</i>									100				10
FORMICARIIDAE													
<i>Thamnophilus doliatus</i>	100	14,2		70	71,4	85,7		70	70	40			100
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>									100				20
<i>Dysithamnus mentalis</i>	100			40	100			30	100				10
<i>Herpsilochmus longirostris</i>	100			30	100			40	100				60
TYRANNIDAE													
<i>Camptostoma obsoletum</i>	100			10	100			20	100				50
<i>Elaenia flavogaster</i>	80	20	20	50	50	100		40	100				40
<i>Elaenia spectabilis</i>	100	42,8	28,5	70	83,3	16,6	16,6	60	75	25	37,5		80
<i>Serpophaga subcristata</i>	75	25	25	40	60	20	20	50	100	16,6	16,6		60
<i>Todirostrum cinereum</i>	100	10		100	90	60		100	100	40			100
<i>Arundinicola leucocephala</i>				100	10								
<i>Fluvicola pica</i>				100	20	100		10					
<i>Hirundinea ferruginea</i>	66,6	66,6		30					100				40

Continua...

Continuação

<i>Machetornis rixosa</i>	25	50	50	40	62,5	75	80	40	40	40	40	50				
<i>Tyrannus savana</i>	33,3	100	33,3	30	50	100	20	75	25	25	25	40				
<i>Tyrannus melancholicus</i>	100	83,3	66,6	60	85,7	85,7	57,1	70	71,4	100	57,1	70				
<i>Empidonomus varius</i>	100	50	100	20	100			10	100			20				
<i>Conopias trivirgata</i>	50	25		25	40	100		20	66,6	33,3		60				
<i>Myiodynastes maculatus</i>	100				30	100	33,3	30	100			20				
<i>Myiozetetes similis</i>		100			10	50	50	20	100			20				
<i>Pitangus sulphuratus</i>	33,3	100	55,5	66,6	90	80	60	70	40	100	100	33,3	33,3	22,2	90	
HIRUNDINIDAE																
<i>Tachycineta albiventer</i>			100		10			100	80					100	50	
<i>Progne tapera</i>		33,3	66,6	33,3	30	16,6	33,3	33,3	33,3	60	50	25	50		40	
<i>Stelgidopteryx ruficollis</i>	100	100			20	100				10	66,6			33,3	30	
TROGLODYTIDAE																
<i>Donacobius atricapillus</i>				100	20											
<i>Troglodytes aedon</i>			100		30	66,6	33,3			30		100			30	
MIMIDAE																
<i>Mimus saturninus</i>	20	100	20		50	22,2	77,7	66,6		90	44,4	100	22,2		11,1	90
TURDIDAE																
<i>Turdus rufigiventris</i>	100				10						100					60
<i>Turdus leucomelas</i>	100	66,6	44,4		90	62,5	62,5	12,5		80	100	20				100
EMBERIZIDAE																
<i>Zonotrichia capensis</i>		50	100		20		100			10						
<i>Sicalis flaveola</i>							100			30		60	40			50
<i>Volatinia jacarina</i>	40	100	60		50			100		20						
<i>Sporophila lineola</i>	75	25	25		40	50	50			40	100					10
<i>Sporophila caerulescens</i>			100		30	50	50			20						
<i>Paroaria capitata</i>	25	50	50		80	25	75	25		40	66,6	33,3	50			60
<i>Thlypsopsis sordida</i>						100		100		10	100					20
<i>Nemosia pileata</i>	66,6	33,3			30	50	50			40	100					30
<i>Thraupis sayaca</i>	37,5	75	37,5		80	66,6	66,6			30	50	25	50			40
<i>Thraupis palmarum</i>	75	25			40		100			10	100					10
<i>Ramphocelus carbo</i>	85,7	28,5	28,5		70	66,6	16,6	33,3	16,6	60	100	12,5				80
<i>Euphonia chlorotica</i>						100				10						
<i>Euphonia violacea</i>						100				10						
<i>Tangara cayana</i>	100				10											
PARULIDAE																
<i>Conirostrum speciosum</i>	100				10						100					50
ICTERIDAE																
<i>Icterus cayanensis</i>	100				10	100				20	100					30
<i>Molothrus bonariensis</i>	71,4	57,1	71,4		70	40	40	80		50	87,5	37,5	25			80
Total de espécies	57	49	38	35	53	48	27	21	60	39	23	08	28			

O maior número de espécies no ambiente florestal foi registrado na ilha Bandeira (Tab. 2), a única onde este valor foi significativamente maior do que no ambiente que teve o segundo maior número de espécies ($\chi^2 = 4,45$; $g1 = 1$; $P < 0,05$). Usando o teste χ^2 (Tabela de Contingência) verificou-se o alto número de espécies que ocorrem nas florestas das ilhas Bandeira e Porto Rico em relação às florestas da ilha Mutum, apesar da menor área deste ambiente nas duas primeiras ($\chi^2 = 14,08$; $g1 = 1$; $P < 0,05$ e $\chi^2 = 12,71$; $g1 = 1$; $P < 0,05$, respectivamente). Entre as florestas das ilhas

Bandeira e Porto Rico, o número de espécies esteve relacionado à área ($\chi^2 = 0,0001$; $g1 = 1$; $P > 0,05$). A ilha Bandeira apresentou a maior porcentagem de espécies com grau de relação superior a 75% ao ambiente florestal (Fig. 3).

Os maiores números de espécies nas zonas arbustivas e campos abertos foram registrados nas ilhas Mutum e Porto Rico (Tab. 2). Porém, o teste χ^2 (Tabela de Contingência) mostra um alto número de espécies em relação à área de zona arbustiva na ilha Bandeira se comparado à ilha Mutum ($\chi^2 = 57,22$; $g1 = 1$; $P < 0,05$) e à ilha

Porto Rico ($\chi^2 = 40,61$; $gl = 1$; $P < 0,05$), ao contrário do que ocorre entre a Mutum e a Porto Rico ($\chi^2 = 1,81$; $gl = 1$; $P > 0,05$). O mesmo ocorre nos campos abertos, que têm área muito reduzida na ilha Bandeira. Assim, apesar da área desses ambientes serem muito menores na ilha Bandeira, o número de espécies não diminuiu acentuadamente. A porcentagem de espécies com grau de relação superior a 75% a esses ambientes foi um pouco menor na ilha Bandeira

do que nas outras duas (Fig. 3). Apesar do alto número de espécies nas zonas arbustivas e campos abertos da ilha Bandeira em relação a sua área, a utilização destes ambientes, baseada no número de espécies agrupadas de acordo com o seu grau de relação a eles, foi significativamente menor do que a verificada no ambiente florestal da mesma ilha ($\chi^2 = 29,52$; $gl = 2$; $P < 0,05$).

Figura 2. Número acumulado de espécies durante os meses de amostragem, considerando-se a lista total de aves registradas e cada uma das ilhas.

O ambiente zona aquática na ilha Mutum teve maior número de espécies registradas (Tab. 2) e maior porcentagem de espécies com grau de relação superior a 75% a esse ambiente (Fig. 3) do que nas outras ilhas. Entretanto, a maior riqueza de espécies na zona aquática dessa ilha parece ser devido a sua maior área, como demonstrado pelo teste χ^2 (Tabela de Contingência) na comparação com a ilha Porto Rico ($\chi^2 = 1,83$; $gl = 1$; $P > 0,05$) e pelo pequeno número de espécies na Bandeira, que tem uma área muito restrita desse ambiente.

2. Falconiformes

Os resultados aqui demonstradas são iniciais e meramente preliminares, já que abrangem apenas os dados obtidos na planície de inundação. Outras áreas amostrais fora da

planície de inundação foram eleitas, a fim de subsidiar melhores conclusões em relação aos objetivos propostos (acréscimo de 16 áreas).

Tabela 3. Índices de similaridade entre os diferentes ambientes (FL: florestas, AR: zonas arbustivas, CA: campos abertos, ZA: zonas aquáticas e BA: bancos de areia): (a) da ilha Mutum; (b) da ilha Porto Rico; (c) da ilha Bandeira.

A				
	FL	AR	CA	ZA
FL		0,73	0,56	0,08
AR			0,71	0,16
CA				0,11

B				
	FL	AR	CA	ZA
FL		0,69	0,52	0,13
AR			0,66	0,14
CA				0,20

		C			
	FL	AR	CA	ZA	BA
FL		0,62	0,40	0,05	0,22
AR			0,64	0,12	0,26
CA				0,06	0,27
ZA					0,27

Figura 3. Número de espécies de aves em cada ambiente (FL: floresta, AR: zona arbustiva, CA: campo aberto, ZA: zona aquática e BA: bancos de areia), expresso em porcentagem, agrupadas de acordo com o seu grau de relação a cada ambiente: até 25%, entre 25,1% e 75% e acima de 75%. (a) ilha Mutum; (b) ilha Porto Rico; (c) ilha Bandeira.

Foram registrados nos quadrados amostrados 14 espécies de Falconiformes, distribuídas pelos diferentes tipos de ambientes (Tab. 4). Duas outras espécies foram detectadas por transectos realizados fora das unidades amostrais (*Pandion haliaetus* e *Falco rufigularis*). Dados sobre a porcentagem dos locais onde cada espécie foi registrada apresentaram valores muito distintos. As espécies denominadas catartídeos (família Cathartidae) foram as que obtiveram um dos maiores valores. *Coragyps atratus* foi registrado em 92,85% dos locais. Já as outras espécies de catartídeos, *Cathartes aura* (78,57%) e *Cathartes burrovianus* (50%), apresentaram-se também relativamente comuns nos locais amostrados. Entre as espécies da família Accipitridae, *Buteo magnirostris* e *Rostrhamus sociabilis* foram as mais observadas, respectivamente presentes em 50% e 42,85% dos locais. Já *Elanus leucurus* e *Busarellus nigricollis* estiveram presentes em 14,28% das amostragens. *Buteogallus urubitinga*, *Heterospizias meridionalis* e *Accipiter striatus* apresentaram-se em 7,14% das amostras. Dentro da família Falconidae, *Polyborus plancus* (57,14%), *Milvago chimachima* (28,57%) e *Falco sparverius* (21,42%) foram as mais comuns.

Os ambientes de várzeas e campos/pastagens apresentaram o maior valor de similaridade (0,857), enquanto que o menor valor (0,471) foi entre mata ciliar e campos/pastagens. Diferenças quanto ao percentual de ocorrência de cada espécie nos locais amostrados podem ser devido a diferentes fatores. Um deles é o alto grau de conspicuidade que algumas espécies apresentam, tais como os catartídeos. Outras espécies também podem ser facilmente detectadas como *Buteo magnirostris* e *Polyborus plancus*. Além disto, a maior parte dos locais amostrados mostraram um claro predomínio de áreas abertas, geralmente formadas por várzeas e campos/pastagens. Com isto, existe uma tendência nos registros de espécies que podem ser consideradas típicas para este tipo de ambiente.

Tabela 4. Dados sobre as localidades e o hábitat das espécies de aves de rapina diurnas encontradas em 14 áreas da planície de inundação do Alto rio Paraná. a) Hábitats: mata: M; bordas de matas e capoeira: BmC; mata ciliar: Mc; várzea: V e campos e pastagens: CP. b) Localidades: indicadas por seus números correspondentes, de acordo com a Tabela 1.

TAXA	LOCALIDADES	HABITAT
CATHARTIDAE		
<i>Coragyps atratus</i>	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14	M, BmC, Mc, V e CP
<i>Cathartes aura</i>	1,3,4,5,6,7,8,9,10,12 e 14	BmC, Mc, V e CP
<i>Cathartes burrovianus</i>	5,6,8,9,10,12 e 13	Mc e V
PANDIONIDAE		
<i>Pandion haliaetus*</i>	-	Mc
ACCIPITRIDAE		
<i>Elanus leucurus</i>	4 e 9	V e CP
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	7,8,10,11,12 e 14	BmC, Mc e V
<i>Accipiter striatus</i>	7	Mc
<i>Buteogallus urubitinga</i>	5	Mc
<i>Heterospizias meridionalis</i>	7	Mc
<i>Busarellus nigricollis</i>	8 e 12	BmC e Mc
<i>Buteo magnirostris</i>	2,3,5,6,8,12 e 14	BmC, Mc, V e CP
FALCONIDAE		
<i>Polyborus plancus</i>	1,3,5,8,9,11,12 e 14	M, BmC, Mc, V e CP
<i>Milvago chimachima</i>	1,3,6 e 12	Mc
<i>Herpetotheres cachimans</i>	2	BmC
<i>Falco ruficularis*</i>	-	CP
<i>Falco sparverius</i>	3,4 e 9	V e CP

* Espécies registradas a partir de transectos fora das unidades amostrais de 1 Km². Nomenclatura está de acordo com Meyer de Schauensee (1982), atualizada por Sick (1993).

Os ambientes de várzeas e campos/pastagens apresentaram o maior valor de similaridade (0,857), enquanto que o menor valor (0,471) foi entre mata ciliar e campos/pastagens. Diferenças quanto ao percentual de ocorrência de cada espécie nos locais amostrados podem ser devido a diferentes fatores. Um deles é o alto grau de conspicuidade que algumas espécies apresentam, tais como os catartídeos. Outras espécies também podem ser facilmente detectadas como *Buteo magnirostris* e *Polyborus plancus*. Além disto, a maior parte dos locais amostrados mostraram um claro predomínio de áreas abertas, geralmente formadas por várzeas e campos/pastagens. Com isto, existe uma tendência nos registros de

espécies que podem ser consideradas típicas para este tipo de ambiente.

Outro bom exemplo da influência da representatividade de ambientes em relação ao registro de espécies pode ser exemplificado pela ocorrência de *Rostrhamus sociabilis*. Esta espécie ocorreu em 42,85% dos locais amostrados, contudo encontrando-se presente em apenas em 6 das 14 áreas amostradas. Em todas as áreas em que esta espécie esteve presente existia a ocorrência de lagoas e/ou ambientes potencialmente alagáveis, áreas consideradas de suma importância para a sobrevivência desta espécie em função principalmente de sua alimentação (em algumas épocas basicamente caramujos aquáticos). Já

aquelas espécies consideradas como de ocorrência associada a ambientes florestais apresentaram-se menos comuns do que as de áreas abertas. Isto se deve sobretudo às diferenças quanto a detectabilidade (Thiollay, 1999) e ao tipo de ambiente específico (aves de rapinas florestais possuem hábitos menos evidentes). Como exemplos podemos citar *Accipiter striatus*, *Buteogallus urubitinga* e *Busarellus nigricollis*.

Os resultados até o momento são preliminares e meramente especulativos. De acordo com o observado, os locais dotados de maior cobertura vegetal, bem como compostos por habitats mais heterogêneos (áreas com florestas mescladas com área potencialmente alagável) sugerem a manutenção de um maior número de espécies, inclusive espécies consideradas mais sensíveis à perturbação (p.ex. *Accipiter striatus*). Análises mais detalhadas com a inclusão de novas áreas estão sendo realizadas a fim de evidenciar os requerimentos de habitat, distribuição e outros fatores que possam explicar a ocorrência de tais espécies nestes ambientes.

3. Trochilidae

O estudo ainda está em fase inicial, tendo sido realizada apenas uma amostragem de campo até o momento, portanto não havendo resultados a serem apresentados nesse instante.

DISCUSSÃO

1. Comunidade de aves das ilhas

A relação entre a área e o número de espécies de aves registradas nas ilhas estudadas é fraca, tanto é que a ilha Bandeira (14 ha) apresentou número levemente maior de espécies do que a Porto Rico (103 ha) e apenas 13 espécies a menos do que a Mutum (área amostral de 200 ha). Comparando-se os ambientes com os seus similares nas outras ilhas, também houve fraca

relação entre área e número de espécies nas três ilhas, com exceção das zonas aquáticas. Forte correlação entre área e número de espécies normalmente é verificada em trabalhos onde são comparados fragmentos florestais ou ilhas bastante homogêneas entre si (Moore & Hooper, 1975; Galli et al., 1976; Martin, 1981; Anjos & Boçon, 1999). Porém, quando as ilhas comparadas apresentam diferente diversidade de ambientes e diferente proporção de cada um destes, o efeito da área sobre o número de espécies pode decrescer (Boecklen, 1986; Warburton, 1997). Assim, a composição e o estado de conservação dos ambientes podem explicar melhor o número de espécies de aves do que simplesmente o tamanho da ilha no presente estudo.

A presença de um ambiente adicional na ilha Bandeira (bancos de areia), com 28 espécies registradas, não justifica o alto número de espécies em relação ao pequeno tamanho dessa ilha, pois apenas 12 destas espécies não ocorreram nos outros ambientes na ilha Bandeira. Entre essas, 10 ocorreram nas zonas aquáticas das ilhas Mutum ou Porto Rico. Somente *Charadrius collaris* e *Rynchops nigra* foram estritamente exclusivas dos bancos de areia. Além disso, mesmo excluindo-se as 12 espécies que na ilha Bandeira só ocorrem nos bancos de areia, o número de espécies nas três ilhas continua sendo estatisticamente semelhante. Assim, a explicação para essa alta riqueza da ilha Bandeira deve ser buscada nos outros ambientes (florestas, zonas arbustivas e campos abertos), onde o número de espécies em relação a área é alto, se comparado com as outras ilhas. Isto é confirmado quando é somado o número total de espécies de cada ilha considerando apenas as florestas, zonas arbustivas e campos abertos, situação em que a ilha Bandeira teria 71 espécies, contra 73 da Mutum e 67 da Porto Rico.

O número de espécies de aves nas ilhas estudadas aumenta seguindo um gradiente sucessional da vegetação, atingindo o pico nas florestas em todas as ilhas. Na ilha Bandeira, o

ambiente florestal destaca-se dos outros por ser o único que tem maior número de espécies do que os seus similares nas outras ilhas. Também apresenta maior porcentagem de espécies com alto grau de relação e menor similaridade com as zonas arbustivas e campos abertos do que verificado nas florestas das outras ilhas. Isto indica que, além do maior número de espécies presentes, o ambiente florestal da ilha Bandeira é ocupado por alta porcentagem de espécies que tem esse ambiente como seu principal hábitat e que uma parte dessas espécies visitam esporadicamente as zonas arbustivas e os campos abertos dessa ilha, o que explica o alto número de espécies nesses dois ambientes, apesar de suas áreas limitadas. Isto é corroborado pelo significativo menor número de espécies com alto grau de relação às zonas arbustivas e aos campos abertos do que às florestas nessa ilha.

O teste χ^2 (Tabela de Contingência) mostrou não haver diferença significativa no número de espécies em relação à área no ambiente florestal entre as ilhas Porto Rico e Bandeira, porém menor porcentagem de espécies apresentou alto grau de relação a este ambiente na Porto Rico. Já nas zonas arbustivas e campos abertos, houve maior porcentagem de espécies com alto grau de relação na ilha Porto Rico do que na Bandeira. Isto indica uma distribuição mais homogênea das espécies entre esses três ambientes na ilha Porto Rico, com muitas delas utilizando-se tanto do ambiente florestal como das zonas arbustivas e campos abertos, fato corroborado pelas mais altas similaridades das florestas com esses dois ambientes do que na ilha Bandeira. Na ilha Mutum ocorre algo muito semelhante a ilha Porto Rico, com a diferença de que a área amostral do ambiente florestal é bem maior, sendo então esperado maior número de espécies do que o registrado.

Uma possível explicação para o cenário anterior pode emergir da análise da Figura 1. Devido ao processo de desmatamento nas ilhas Mutum e Porto Rico, o ambiente florestal é representado por fragmentos florestais

entrecortados por áreas abertas. Essas clareiras (zonas arbustivas e campos abertos) normalmente são ocupadas por aves bastante generalistas em relação a alimentação e utilização do hábitat (Lovejoy et al., 1986; Anjos et al., 1997; Gimenes & Anjos, 2000), fato confirmado pela presença de apenas três espécies exclusivas nas zonas arbustivas e nenhuma nos campos abertos nas ilhas estudadas. Muitas destas aves utilizam também os fragmentos florestais, sendo aparentemente mais bem sucedidas do que aquelas especialistas de florestas. A ilha Bandeira apresenta cobertura florestal contínua, não fragmentada e com área bastante reduzida de zonas arbustivas e campos abertos. Nesta ilha, a floresta é circundada de um lado pelo rio e do outro pelos bancos de areia. O rio dificulta a livre movimentação das espécies invasoras e os bancos de areia são ocupados principalmente por aves aquáticas que praticamente não utilizam-se da floresta, a não ser como local de descanso e esconderijo, em alguns casos. Portanto, a cobertura florestal contínua e a quase ausência de áreas antropizadas provavelmente é o ponto fundamental na determinação da alta riqueza da ilha Bandeira.

Conservação

A área de estudo está inserida numa região de grande importância ecológica, já que este é o último trecho do rio Paraná livre de barramento em território brasileiro. Apesar da alta degradação antrópica, o local abriga os últimos remanescentes da floresta estacional semidecidual aluvial do noroeste paranaense, além de apresentar boa representatividade da fauna original e ter papel fundamental na manutenção da diversidade biótica regional (Agostinho, 1997). Duas espécies de aves registradas no presente estudo estão presentes na lista de espécies ameaçadas do Estado do Paraná (Paraná. Secretaria de Estado e Meio Ambiente, 1995): *Tigrisoma fasciatum* e *Galbula ruficauda*.

Os primeiros resultados obtidos no estudo da avifauna demonstram a importância da cobertura florestal na determinação do número de espécies de aves presentes. No caso das ilhas, mais importante do que a área total é a presença de florestas contínuas, que não tenham sido fragmentadas por ação antrópica. Essa constatação está de acordo com Warburton (1997), que afirma que pequenos fragmentos tendem a convergir na composição de espécies de aves, suportando aquelas mais comuns localmente e que sobrevivem bem em ambientes alterados. Essas informações podem servir como importante critério de seleção caso em algum momento seja necessário estabelecer ilhas de maior prioridade de conservação.

Apesar de ser mais importante dar prioridade de conservação à ilhas que, apesar de menores, tenham cobertura florestal contínua e pouco perturbada (ex. Bandeira) do que à ilhas de área bem superior, mas altamente degradadas (ex. Mutum e Porto Rico), essas últimas não podem ser ignoradas em termos de preservação. Em ambientes pequenos e isolados é comum a extinção de populações locais e a única maneira da espécie voltar a ocupar a área é por meio de recolonização, que pode ser efetuada se áreas fontes estiverem suficientemente próximas das áreas a serem colonizadas (Simberloff & Abelle, 1982). Os fragmentos florestais das ilhas Mutum e Porto Rico podem funcionar, portanto, como estoque populacional de determinadas espécies, facilitando uma eventual recolonização de florestas mais bem conservadas.

REFERÊNCIAS

- AGOSTINHO, A. A. Qualidade dos habitats e perspectivas para a conservação. In: VAZZOLER, A. E. A. M.; AGOSTINHO, A. A.; HAHN, N. S. (Ed.). *A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos*. Maringá: EDUEM: Nupélia, 1997. cap. 4, p. 455-460.
- ANJOS, L.; BOÇON, R. Bird communities in natural forest patches in southern Brazil. *Wilson Bull.*, Lawrence, v. 111, no. 3, p. 397-414, 1999.
- ANJOS, L.; SCHUCHMANN, K.-L.; BERNDT, R. Avifaunal composition, species richness, and status in the Tibagi River Basin, Parana State, southern Brazil. *Orn. Neotrop.*, Montreal, v. 8, p. 145-173, 1997.
- ARAÚJO, A. C.; FISHER, E. A.; SAZIMA, M. Floração sequencial e polinização de três espécies de *Vriesea* (Bromeliaceae) na região da Juréia, sudeste do Brasil. *Revta Brasil. Bot.* v. 17, n. 2, p. 113-118, 1994.
- BOECKLEN, W. J. Effects of habitat heterogeneity on the species-area relationships of forest birds. *J. Biogeogr.*, Oxford, v. 13, p. 59-68, 1986.
- BROWN, J. H.; KODRIC-BROWN, A. Convergence, competition, and mimicry in a temperate community of hummingbird-pollinated flowers. *Ecology*, v. 60, no. 5, p. 1022-1035, 1979.
- CAMPOS, J. B.; SOUZA, M. C. Vegetação. In: VAZZOLER, A. E. A. M.; AGOSTINHO, A. A.; HAHN, N. S. (Ed.). *A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos*. Maringá: EDUEM: Nupélia, 1997. cap. 12, p. 331-342.
- FULLER, M.; MOSHER, J. A. Raptor survey techniques. In: PENDLETON, B. A. G.; MILLSAP, B. A.; KLINE, K. W.; BIRD, D. M. (Ed.). *Raptor Management Techniques Manual*. Washington D. C.: National Wildlife Federation, 1987, p. 37 - 66.
- GALLI, A. E.; LECK, C. F.; FORMAN, R. T. T. Avian distribution patterns in forest islands of different sizes in central New Jersey. *Auk*, Lawrence, v. 93, p. 356-364, 1976.
- GIMENES, M. R.; ANJOS, L. Distribuição espacial de aves em um fragmento florestal do campus da Universidade Estadual de Londrina, norte do Paraná, Brasil. *Rev. Bras. Zool.*, Curitiba, v. 17, n. 1, p. 263-271, 2000.
- KEARNS, C. A.; INOUE, D. W. *Techniques for pollination biologists*. Colorado, 1993. 214 p.
- LOVEJOY, T. E.; BIERREGAARD, JR. R. O.; RYLANDS, A. B.; MALCOLM, J. R.; QUINTELA, C. E.; HARPER, L. H.; BROWN, JR. K. S.; POWELL, A. H.; ROWELL, G. V. N.; SCHUBART, H. O. R.; HAYS, M. B. Edge and other effects of isolation on Amazon forest fragments. In: SOULÉ, M. E.

- (Ed.). *Conservation biology: the science of scarcity and diversity*. Sunderland: Sinauer Associates, c1986. cap. 12, p. 257-285.
- MARTIN, T. E. Limitation in small habitat islands: chance or competition. *Auk*, Lawrence, v. 98, p. 715-734, 1981.
- MEYER DE SCHAUENSEE, R. *A guide to the birds of South America*. Philadelphia, 1982.
- MOORE, N. W.; HOOPER, M. D. On the number of bird species in British woods. *Biol. Conserv.*, Oxon, v. 8, p. 239-250, 1975.
- PARANÁ. Secretaria de Estado do Meio Ambiente. *Lista vermelha de animais ameaçados de extinção no Estado do Paraná*. Curitiba, 1995. 177 p., il.
- SCHERER-NETO, P.; STRAUBE, F. C. *Aves do Paraná (história, lista anotada e bibliografia)*. Curitiba: Edição dos autores, 1995. 79p., il.
- SCHUCHMANN, K.-L. Hummingbirds. In: HOYO, J.; ELLIOT, A.; SARTAL, J. (coords.). *Handbook of the birds of the world*. v. 5. Barcelona: Lynx, 1999. p. 468-680.
- SICK, H. *Birds in Brazil: a natural history*. Princeton, 1993.
- SIMBERLOFF, D.; ABELLE, L. G. Refuge design and island biogeographic theory: effects of fragmentation. *Am. Nat.*, v. 120, p. 41-50, 1982.
- SOUZA, M. C.; CISLINSKI, J.; ROMAGNOLO, M. B. Levantamento florístico. In: VAZZOLER, A. E. A. M.; AGOSTINHO, A. A.; HAHN, N. S. (Ed.). *A planície de inundação do alto rio Paraná: aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos*. Maringá: EDUEM: Nupélia, 1997. cap. 2, p. 343-368.
- STILES, F. G. Ecology, flowering phenology, and hummingbird pollination of some Costa Rican *Heliconia* species. *Ecology*, v. 56, p. 285-301, 1975.
- STOTZ, D. F.; FITZPATRICK, J. W.; PARKER, T. A.; MOSKOVITS, D. K. *Neotropical Birds – ecology and conservation*. Chicago: University of Chicago Press, 1996, 478p.
- STRAUBE, F. C.; BORNSCHEIN, M. R. News or noteworthy records of birds from northwestern Parana and adjacent areas (Brazil). *Bull. Brit. Ornith. Club*, v. 115, no. 4, p. 219-225, 1995.
- STRAUBE, F. C.; BORNSCHEIN, M. R.; SCHERER-NETO, P. Coletânea da avifauna da região Noroeste do Estado do Paraná e áreas limítrofes (Brasil). *Arq. Biol. Tecnol.*, Curitiba, v. 39, n. 1, p. 193-214, mar. 1996.
- THIOLLAY, J. M. Distributional patterns of raptors along altitudinal gradients in the northern Andes and effects of forest fragmentation. *Journal of Tropical Ecology*, v. 12, p. 535 –560, 1996.
- THIOLLAY, J. M. Responses of an avian community to rain forest degradation. *Biodiversity and Conservation*, v. 8, p. 513 – 534, 1999.
- WARBURTON, N. H. Structure and conservation of forest avifauna in isolated rainforest remnants in tropical Australia. In: LAURANCE, W. F.; BIERREGAARD, JR. R. O. (Ed.). *Tropical forest remnants: ecology, management and conservation of fragmented communities*. Chicago, London: The University of Chicago Press, 1997. cap. 13, p. 190-206.